

Referenzen

*Die präsentierten Ergebnisse basieren auf Real-World-Daten inkl. MINT und MIBERIC. Solche Daten aus der klinischen Praxis spiegeln den tatsächlichen Versorgungsalltag wider und können daher auch Informationen zu Kombinationstherapien enthalten.¹ Bei Proband:innen mit MF oder SS, die mit Mogamulizumab behandelt wurden, besteht ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Infektion und/oder Virusreaktivierung. Die Kombination von Mogamulizumab mit systemischen immunmodulierenden Arzneimitteln oder mit anderen zugelassenen Therapien für MF oder SS wurde nicht geprüft und wird daher nicht empfohlen, insbesondere in Anbetracht des Risikos schwerer Infektionen bei mit Mogamulizumab behandelten Patient:innen. Topische Steroide oder systemische Corticosteroide in niedriger Dosierung können während der Behandlung mit Mogamulizumab verwendet werden. Das Risiko einer schwerwiegenden Infektion und/oder Virusreaktivierung kann jedoch bei gleichzeitiger Verabreichung mit systemischen Immunsuppressiva höher sein. Die Patient:innen sollten auf Anzeichen und Symptome einer Infektion überwacht, und gegebenenfalls umgehend behandelt werden.⁶

1. Assaf C, et al. EORTC-CLTG 2024, Lausanne, Switzerland, 9.–11.10.2024; Abstract #A-200.
2. Beylot-Barry M, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023;37:1777-84.
3. Romero PO, et al. EORTC-CLTG 2024, Lausanne, Switzerland, 9.–11.10.2024; Abstract #A-198.
4. Kim YH, et al. Lancet Oncol 2018;19:1192-204.
5. Bozonnet A, et al. EClinicalMedicine 2024;73:102679.
6. POTELOGE[®] Fachinformation, aktueller Stand.