

Indikation und Referenzen

* PADCEV™ ist u. a. in Kombination mit Pembrolizumab angezeigt zur Erstlinientherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Urothelkarzinom (UC), die für eine platinhaltige Chemotherapie infrage kommen (aktuelle Fachinformation PADCEV™).⁸

1 Fahey CC et al., Curr Oncol 2025, 32:278.

2 Powles T et al., Ann Oncol 2024, 35:485–490.

3 Van der Heijden AG et al., EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer – limited update March 2025. European Association of Urology 2025.

4 Powles T et al., ASCO GU 2025, #664.

5 Powles T et al., Ann Oncol 2025, 29:S0923–7534(25)00762–8.

6 Niedersuess-Beke D et al., J Clin Oncol 2025, 43:5 (Suppl); ASCO GU 2025, Poster #736.

7 Zschaebitz S et al., J Clin Oncol 2025, 43:5 (Suppl); ASCO GU 2025, #715.

8 Aktuelle Fachinformation PADCEV™.

Abkürzungen

1-Line – Erstlinie, **EV** – Enfortumab Vedotin, **mUC** – metastasiertes Urothelkarzinom,
P – Pembrolizumab, **RW** – Real-World.

ESMO –
Leitlinie²

EAU –
Leitlinie³