

Fußnoten:

* Fasenra® ist angezeigt als *Add-on*-Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patient:innen mit schwerem eosinophilem Asthma, das trotz hochdosierter inhalativer Corticosteroide plus lang wirksamer Beta-Agonisten unzureichend kontrolliert ist.¹

Integrierte Analyse von XALOC-2, einem einarmigen, prospektiven, beobachtenden, multinationalen Real-World-Evidenz-Programm, das 534 Erwachsene mit schwerem eosinophilem Asthma untersucht, die Fasenra® gemäß der lokalen Standardbehandlung erhalten. Eine Reduktion um $\geq 0,5$ Punkte ist die kleinste Änderung, die klinisch relevante Verbesserung bedeutet. Patient:innen mit einem ACQ-Wert im Ausgangszeitraum (12 Monate vor Behandlungsbeginn mit Fasenra®) und mind. einer weiteren Bewertung nach Studienbeginn.²

ACQ: Asthma Control Questionnaire; **EOS:** Eosinophile

Referenzen:

1. Fachinformation Fasenra®. Stand Oktober 2024.
2. Lommatzsch M et al. Asthma control and clinical remission in severe eosinophilic asthma (SEA) after 2 years of benralizumab treatment: prospective real-world data from XALOC-2. Präsentiert auf dem ERS 2025, Poster PA5705 (inkl. Supplement).