

Referenzen

* Wie bei allen modellbasierten Ansätzen im Bereich der ATTR-CM üblich, können unterschiedliche Modelle zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.²

** Vyndaqel® (Tafamidis) 61 mg und Vyndaqel® (Tafamidis-Meglumin) 80 mg sind indiziert zur Behandlung der Wildtyp- oder hereditären Transthyretin-Amyloidose bei erwachsenen Patient:innen mit Kardiomyopathie.¹

Eine einzelne Kapsel Vyndaqel® 61 mg ist bioäquivalent zu Vyndaqel® 80 mg (vier Kapseln zu 20 mg). Diese sind auf Basis der mg-Angabe nicht gegeneinander austauschbar.^{1,6}

vs. Placebo, sekundärer Endpunkt, die Studienarme Tafamidis-Meglumin 80 mg QD und 20 mg QD wurden für diese Analyse zusammengefasst.⁵

1. Fachinformation Vyndaqel® 61 mg, aktueller Stand.
2. Elliott P et al. Circ Heart Fail. 2022;15(1):e008193
3. Damy T et al. Eur J Heart Fail. 2025;27(12):2998–3009.
4. Garcia-Pavia P et al. JACC Heart Fail. 2024;12(1):150–160
5. Maurer MS et al. New Engl J Med. 2018;379(11):1007–16.
6. Lockwood PA et al. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849–854.