

ALK = anaplastische Lymphomkinase; **EGFR** = epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor; **ES-SCLC** = fortgeschrittenes kleinzelliges Lungenkarzinom; **HR** = Hazard Ratio; **KI** = Konfidenzintervall; **mPFS** = medianes progressionsfreies Überleben; **NSCLC** = nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom; **PD-1** = programmed cell-death-1; **ROS1** = ROS Protoonkogen 1.

a HETRONIFLY® in Kombination mit Carboplatin und Pemetrexed ist für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patient*innen mit nicht-plattenepitheliale NSCLC ohne EGFR-, ALK- oder ROS1-positive Mutation indiziert, bei denen

- ein lokal fortgeschrittenes NSCLC vorliegt und die nicht für eine Operation oder Strahlentherapie in Frage kommen, oder
- bei denen das NSCLC metastasiert ist.¹

HETRONIFLY® in Kombination mit Carboplatin und Nab-Paclitaxel ist für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patient*innen mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem plattenepitheliale nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom indiziert.¹

b In Kombination mit Carboplatin und Etoposid.

c Nicht-plattenepitheliales NSCLC: Pemetrexed und Carboplatin; plattenepitheliales NSCLC: Nab-Paclitaxel und Carboplatin.

d Nicht-plattenepitheliales NSCLC: HR = 0,54 (95 %-KI: 0,43–0,68); $p < 0,0001$;

plattenepitheliales NSCLC: HR = 0,53 (95 %-KI: 0,42–0,67).^{2,4}

1. Fachinformation HETRONIFLY®, Stand 06-2026.
2. Shi Y et al. Ann Oncol 2025; 36(suppl_2): S1–S60.
3. Wang L et al. Lancet Respir Med 2026; 14(2): 117–128.
4. Zhou C et al. Cancer Cell 2024; 42(2): 198–208.e3.