

Referenzen

CKD = chronische Nierenkrankheit. eGFR = geschätzte glomeruläre Filtrationsrate. RRR = relative Risikoreduktion. SGLT-2i = Natrium-Glukose-Cotransporter-2-Inhibitor.

a Zum aktuellem Stand (08/2026) ist FORXIGA® der einzige SGLT-2i, für den eine signifikante Risikoreduktion im Endpunkt Gesamtmortalität bei CKD nachgewiesen werden konnte. Direkte Vergleichsstudien (Head-to-Head) mit anderen SGLT-2i zur Gesamtmortalität liegen nicht vor; aus den vorliegenden Daten wird keine allgemeine Überlegenheit gegenüber anderen SGLT-2i abgeleitet.

b Einer von drei sekundären Endpunkten der DAPA-CKD-Studie.¹ Die sekundären Endpunkte waren signifikant: (i) kombinierter sekundärer Endpunkt aus anhaltender Abnahme der eGFR um $\geq 50\%$, terminaler Nierenkrankheit oder renalem Tod (RRR 44 %). (ii) Kombiniertes sekundärer Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod oder Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz (RRR 29 %). (iii) Gesamtmortalität (RRR 31 %).¹

1 Vgl. Heerspink HJL et al. N Engl J Med 2020; 383:1436–1446.